

MAGGOTS GR

Larvicid, používaný v živočišné výrobě k hubení larev much.
Obsahuje silný růstový regulátor účinný na všechny druhy.

Aplikační programy:

Zařízení pro chov skotu

Hluboká podestýlka: ošetřete okraje a povrch rozlité tekutiny kolem žlabů a napáječů a místa, kde se hromadí hnůj. V přístřešcích pro telata umístěných venku ošetřete kompletně celý povrch. **MAGGOTS GR** aplikujte postřikem nebo kropením přibližně 3 dny po odklizení hnoje a ošetření opakujte po každém dalším odklizení nebo když se objeví larvy much. Roštová podlaha: ošetřete celou plochu podlahy hned po vyčištění, ošetření opakujte po každém dalším odklizení hnoje, nebo když se objeví larvy much.

Zařízení pro chov prasat

Systém kompletního úklidu s vyklizením a navezením zvířat v jeden den: **MAGGOTS GR** aplikujte nejlépe rozhozem hned po vyčištění a před navezením prasat.

Roštová podlaha: ošetřete celou plochu podlahy hned po vyčištění, ošetření opakujte po každém dalším vyklizení hnoje, nebo když se objeví larvy much.

Hluboká podestýlka: **MAGGOTS GR** aplikujte postřikem nebo kropením přibližně 3 dny po vyklizení hnoje a ošetření opakujte po každém dalším vyklizení hnoje nebo když se objeví larvy much. Ošetřete celý povrch podlahové plochy a vlhká místa kolem žlabů a napáječů.

Zařízení pro chov drůbeže

MAGGOTS GR aplikujte postřikem nebo kropením na celou plochu podlahy přibližně 1 týden po vyklizení trusu.

Ošetření opakujte po každém dalším vyklizení, nebo když se objeví larvy much.

Ostatní chovná zařízení

MAGGOTS GR se může stejným způsobem používat také v zařízení pro chov ovcí a koz, na králičích farmách, v zoologických zahradách, na norkových a liščích farmách.

Suchý rozhoz: **MAGGOTS GR** aplikujte přímo a rovnoměrně na místa,

kde mouchy kladou vajíčka. Metodu suchého rozhozu používejte jen

v případě vlhkého nebo tekutého podkladu.

Postřik: důkladně promíchejte uvedené množství přípravku **MAGGOTS GR**

s odpovídajícím množstvím vody. Aplikujte na místa, kde mouchy kladou

vajíčka, pomocí zádového postřikovače nebo automatického

postřikovacího zařízení.

Kropení: důkladně promíchejte uvedené množství přípravku

MAGGOTS GR s odpovídajícím množstvím vody. Roztok aplikujte

konví rovnoměrně na místa, kde mouchy kladou vajíčka.

Důležité upozornění: **MAGGOTS GR** se aplikuje pouze na místa, kde

mouchy kladou vajíčka. Není určen k aplikaci na místa, kam mouchy

sedají (stěny, stropy atd.), protože na dospělé jedince neúčinkuje.



5kg
25kg

Časový interval ošetření

Doporučený časový interval ošetření závisí na způsobu hospodaření a ustájení, stejně jako na klimatických podmínkách. Může se pohybovat v rozmezí od 2–3 týdnů až po několik měsíců. Aplikaci je možné provádět za přítomnosti zvířat. Často postačí ošetřovat v intervalu 6 týdnů. V chovech skotu je doporučeno začít před sezónou much, tj. od měsíce března/dubna.

Typ aplikace	Aplikovaná dávka	Ošetřená plocha
Suchý rozhoz	250 g	10 m ²
Postřik	25g / 1-4 l vody	10 m ²
Kropení	25g / 10 l vody	10 m ²



Kontakty



Tekro, spol. s r.o.

Višňová 484/2, 140 00 Praha 4, www.tekro.cz

Výrobní závod: Nová Dědina, 783 91 - Uničov

Objednávky: tel.: +420 585 004 366, fax: +420 585 004 303



ODDĚLENÍ ZOOHYGIENY:

Area manager ČR

MVDr. Pavlína Bidlová

tel.: +420 734 180 001

p.bidlova@tekro.cz

Vedoucí oddělení

Ing. Karel Tittl


tel.: +420 602 221 410, k.tittl@tekro.cz

Podpora prodeje

Ing. Stanislav Polcr

tel.: +420 725 763 860, s.polcr@tekro.cz

Česká republika - regiony



Ing. Hana Drápalová

Tel. +420 606 756 499

h.drapalova@tekro.cz

Ing. Radek Mayer

Tel. +420 725 784 198

r.mayer@tekro.cz

Ing. Radek Mayer

Tel. +420 725 784 198

r.mayer@tekro.cz

Ing. Martin Vyroubal

Tel. +420 723 634 199

m.vyroubal@tekro.cz

Ing. Jaroslav Servus

Tel. +420 601 581 858

j.servus@tekro.cz

Používejte biocidy bezpečným způsobem.

Před použitím si vždy přečtete označení a informace o přípravku.

Pro podrobnější informace kontaktuje: Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4.

Ing. Karel Tittl, tel.: + 420 602 221 410; e-mail: k.tittl@tekro.cz